

LISTE ROUGE DES OISEAUX HIVERNANTS DU GRAND EST

2024



Les Listes rouges des espèces menacées en Grand Est
Volet Faune





UN TRAVAIL COLLECTIF

COMITÉ D'ÉVALUATION

Jean-Marc Bronner, Yohann Brouillard, Eric Buchel, Roberto D'Agostino, Christian Dronneau, Christian Frauli, Matthieu Gaillard, Moana Grysan, Nicolas Harter, Nicolas Hoffmann, Gérard Joannes, Guillaume Leblanc, Pierre Miguet, Aymeric Mionnet, Jean-Yves Moitrot, Yves Muller, Julien Rougé

STRUCTURES CONTRIBUTRICES (DONNÉES ET/OU EXPERTISES)

Association Nature du Nogentais, Collectif Faune Champagne-Ardenne, Collectif Faune Lorraine, Conservatoire d'Espaces Naturels d'Alsace, Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Sud Champagne, Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est, Groupe Tetras Vosges, Lorraine Association Nature, Ligue pour la Protection des Oiseaux d'Alsace, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Meurthe-et-Moselle, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Meuse, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Moselle, REgroupement des Naturalistes ARDennais, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient, Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Office Français de la Biodiversité, Office National des Forêts, autres producteurs via le SINP national

ÉQUIPE PROJET

Eric Buchel, Wendy Hahn, Nicolas Hoffmann, Aymeric Mionnet, Yves Muller

COORDINATION GÉNÉRALE ODONAT Grand Est

PHOTOGRAPHIES

Couverture : Cygne chanteur *Cygnus cygnus* et Cygne de Bewick *Cygnus columbianus* [VU] - C. METZ, Canard souchet *Anas clypeata* [LC] - C. TOMASSON, Fuligule morillon *Aythya fuligula* [VU] - C. TOMASSON, Courlis cendré *Numenius phaeopus* [VU] - J-P FORMET

- Page 2 : Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* [NT] - P. MATZKE
- Page 3 : Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* [NT] - C. STENGER, Canard pilet *Anas acuta* [LC] - F. CROSET
- Page 4 : Fuligule milouin *Aythya ferina* [NT] - D. HACKEL
- Page 5 : Harle bièvre *Mergus merganser* [LC] : L. ROUSCHMEYER
- Page 6 : Canard chipeau *Anas strepera* [LC] : F. CROSET
- Page 12 : A. MIONNET, Oies des moissons *Anser fabalis* [VU] - V. PALOMARES, A. SINDT-VONFLIE

Encadrés espèces (de haut en bas) :

- Page 13 : Harle piette *Mergellus albellus* [VU] - B. HERGOUEL
- Page 14 : D. HACKEL, J-P. FORMET
- Page 15 : H. ENOCH, P. MATZKE
- Page 16 : P. BOURGUIGNON, P. MATZKE
- Page 17 : D. HACKEL, F. ROUBERT, S. GAILLARD
- Page 18 : N. HOFFMANN, N. BUHREL

3^e de couverture : C. ZELL

4^e de couverture : Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* [NT] M. SOLARI

PRÉSENTATION

OISEAUX HIVERNANTS

Sur les 11 000 espèces d'oiseaux peuplant la planète, plus de 2 000 effectuent des déplacements saisonniers séparant leurs sites de reproduction de leurs zones d'hivernage. Mais en Europe, rares sont les espèces strictement sédentaires. Deux principales stratégies de migrations s'observent chez les oiseaux. Les migrateurs au long cours qui se déplacent sur de grandes distances et dont l'ensemble des individus quittent les lieux de reproduction (Bondrée apivore, Gobemouche noir, Hirondelle rustique, etc.), et les migrateurs partiels dont les individus se déplacent plus ou moins en fonction de leur origine géographique (Bouvreuil pivoine, canards, Corbeau freux, etc.). Cette seconde stratégie est davantage liée aux aléas climatiques et aux périodes de gel et d'enneigement qui forcent les oiseaux les plus septentrionaux à se déplacer, alors que la première résulte d'une longue évolution ayant pour origine le manque de nourriture (insectes notamment).

La Sterne arctique est l'oiseau dont la distance entre ses sites de reproduction arctiques ou subarctiques et ses lieux d'hivernage proches du continent Antarctique sont les plus élevées : 60 000 km. Alors que le record de durée de vol sans escale est détenu par une Barge rousse qui a parcouru plus de 13 500 km en 11 jours, entre l'Alaska où elle est née et la Tasmanie.

Au même titre que les sites de reproduction, les aires de stationnement lors des migrations et les zones d'hivernage sont indispensables au cycle de vie des oiseaux. Les lieux accueillant un grand nombre d'oiseaux hivernants ou migrateurs doivent être protégés.

L'AVIFAUNE HIVERNANTE DANS LE GRAND EST

Avec un climat de type continental caractérisé par de fréquentes gelées, le Grand Est est naturellement peu favorable à l'accueil de l'avifaune migratrice.

Toutefois, la présence de plusieurs centaines d'étangs (Woëvre, Champagne humide, Moselle), de grandes vallées alluviales et le cours du Rhin rendent ce territoire particulièrement propice pour l'accueil des oiseaux d'eau hivernant.

Cette attractivité naturelle a été renforcée par la création entre 1965 et 1990 de plusieurs grands réservoirs



CHIFFRES CLÉS

- 25 espèces hivernantes évaluées en Europe ¹
- 60 espèces hivernantes évaluées en France ²
- 30 espèces hivernantes évaluées en Grand Est



dont les principaux ont été conçus pour réguler les grands fleuves du bassin de la Seine (Marne, Seine et Aube). Ce sont ainsi près de 100 km² de vasières et d'eau libres relativement tranquilles que l'avifaune peut fréquenter.

Le Grand Est a historiquement toujours abrité les plus gros effectifs français d'anatidés septentrionaux (Harle bièvre **LC**, Harle piette **VU**, Garrot à œil d'or **VU**, Cygne chanteur **VU** et Cygne de Bewick **VU**) dans le prolongement de leurs aires d'hivernages germaniques. C'est aussi le cas pour la Grue cendrée **LC**, l'Oie rieuse **NT**, l'Oie des moissons **VU** et l'Oie cendrée **LC**.

Cependant certaines de ces espèces se raréfient avec la succession d'hiver doux due au changement climatique qui les incitent à hiverner plus au nord alors que d'autres traditionnellement peu présentes dans notre région car sensibles aux longues périodes de gel voit leur abondance augmenter : canards de surface (Canard pilet **LC**, Canard souchet **LC**, Canard chipeau **LC**, Canard siffleur **LC**, Sarcelle d'hiver **LC**) et limicoles (Vanneau huppé **LC**, Pluvier doré **LC**, Bécasseau variable **NA**).

Ces changements qui ne font que commencer permettent aujourd'hui au Grand Est d'accueillir près de 200 000 oiseaux d'eau hivernants soit un peu moins de 10% de l'effectif national. Sur ces quarante dernières années, les populations d'oiseaux d'eau du Grand Est ont augmenté plus vite (+151%) qu'au niveau national (+109%).

ÉTAT DES CONNAISSANCES

Les premiers ouvrages ornithologiques sont publiés dès le XVII^e siècle mais sont rares jusqu'aux années 1950-1960. L'engouement pour l'ornithologie de terrain se développe considérablement dans la seconde moitié du XX^e siècle et diverses revues régionales apparaissent et des atlas sont publiés (Alsace, Champagne-Ardenne). Avec l'apparition des bases de données en ligne dans les années 2010, la masse d'observations recueillies prend un nouvel essor : 950 000 à 1 000 000 de données ornithologiques réparties dans tout le Grand Est sont saisies chaque année.

De nombreux contributeurs participent également à des suivis nationaux ou internationaux annuels à long terme comme les comptages d'oiseaux d'eau instaurés en France dans les années 1960. Ils ont lieu chaque hiver à la mi-janvier et couvrent l'ensemble des sites importants pour l'hivernage de l'avifaune aquatique. D'autres espèces comme le Milan royal **NA**, la Grue cendrée **LC** et les Laridés sont aussi régulièrement recensées. Un programme de Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC) existe également depuis 2014 et vise à mesurer les variations d'abondance dans l'espace et le temps des oiseaux communs en hiver. Toutes ces investigations font que l'avifaune est un des groupes faunistiques les plus étudiés et les mieux connus du Grand Est.

Pour élaborer la présente liste rouge, 1 193 000 données hivernales (décembre-janvier) ont été utilisées, dont 1 032 000 (soit plus de 86%) couvrent la période postérieure à 2010.

ANALYSE DES RÉSULTATS


Parmi tous les oiseaux observés en hiver, seules les populations hivernantes se reproduisant en dehors du Grand Est ont été considérées. Toutes les espèces strictement sédentaires ont donc été exclues d'emblée.

215 espèces visiteuses en période hivernale ont été listées dans la région Grand Est depuis l'an 1500. Pour qu'une espèce soit évaluée à sa juste valeur, sa présence doit être régulière en hiver et ses effectifs significatifs dans un contexte national.

Ainsi, 92 espèces occasionnelles en hiver (Mouette pygmée **NA**, Pluvier argenté **NA**, Mésange charbonnière **NA**, etc.) ont été écartées, de même que 94 espèces régulières, mais dont les effectifs ne représentent qu'un faible pourcentage de la population hivernant en France (Bécasseau variable **NA**, Grive mauvis **NA**, Plongeon arctique **NA**, etc.) ou que la présence significative n'est pas établie (Alouette des champs **NA**, Bécassine des marais **NA**, Pigeon colombin **NA**, etc.). Une espèce introduite, le Cygne tuberculé **NA**, a aussi été exclue. Des 30 espèces restantes, 7 (23%) sont vulnérables, 6 (20%) sont quasi-menacées et 17 (57%) sont en préoccupation mineure.

La plupart de ces espèces sont des oiseaux aquatiques dont les populations hivernantes recensées chaque hiver depuis des décennies sont bien connues. Sept espèces sont en déclin, parmi lesquelles l'Oie des moissons **VU** et le Fuligule morillon **VU** ont divisé leur population par deux en 20 ou 30 ans. Les effectifs de Harle pie **VU** déclinent aussi de façon importante. Pour ces trois espèces, le Grand Est accueille une part importante du nombre d'individus hivernant en France. Le Grèbe castagneux **NT**, le Fuligule milouin **NT**, la Mouette rieuse **NT** et le Busard Saint-Martin **NT** sont également en diminution.


Six espèces présentent des effectifs réduits, dont quatre sont menacées : le Cygne chanteur **VU**, le Cygne de Bewick **VU** et le Garrot à œil d'or **VU**, dont 75 à 90% des individus hivernant en France se trouvent dans le Grand Est, ainsi que le Coulis cendré **VU** qui voit ses effectifs augmenter. Le Grand Est accueille aussi les 3/4 des Oies rieuses **NT** hivernant en France. Cet anatidé est en augmentation significatif, tout comme la Nette rousse **NT**, et ont de ce fait été sorties de la catégorie des espèces menacées.



SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS

- 7 espèces menacées classées *Vulnérables* **VU**, soit 23% des espèces évaluées
- 6 espèces *Quasi menacées* **NT**
- 17 espèces *Préoccupation mineure* **LC**



Catégories UICN

		Nombre d'espèces	Proportion
RE	Éteinte régionalement (RE)	0	0%
CR	En danger critique d'extinction (CR) <i>dont En danger critique d'extinction, présumé disparu (CR*)</i>	0 0	0% 0%
EN	En danger (EN)	0	0%
VU	Vulnérable (VU)	7	23%
NT	Quasi menacée (NT)	6	20%
LC	Préoccupation mineure (LC)	17	57%
DD	Données insuffisantes (DD)	0	0%

Sous-total Liste rouge

7 23%

Sous-total des taxons évalués

30 100%

14%

NAi	Non applicable (NAi) - Taxon introduit dans la période récente (après 1500) dans la région étudiée	1
NAr	Non applicable (NAr) - Taxon d'apparition récente (moins de 10 ans) dans la région étudiée	0
NAo	Non applicable (NAo) - Taxon occasionnel, non implanté dans la région étudiée	91
NAns	Non applicable (NAns) - Taxon hivernant régulier mais dont la population hivernante régionale n'est pas significative (moins de 1% de la population hivernante nationale)	60
NAd	Non applicable (NAd) - Taxon hivernant mais sans données suffisantes pour déterminer si la population hivernante régionale est significative (au moins 1% de la population hivernante nationale)	33
NAnc	Non applicable (NAnc) - Statut d'indigénat non confirmé dans la région étudiée	0
NA	Sous-total des taxons Non applicable (NA)	185

86%

Total des taxons étudiés

215

LISTE DES ESPÈCES



Ordre de menace, puis ordre alphabétique par nom vernaculaire

Domaine taxinomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Liste rouge Grand Est Catégorie UICN	Critères UICN
Oiseaux hivernants	<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	VU	D1
Oiseaux hivernants	<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur	VU	EN (D) (-1)
Oiseaux hivernants	<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne de Bewick	VO	D1
Oiseaux hivernants	<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	VU	A2a
Oiseaux hivernants	<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or	VU	D1
Oiseaux hivernants	<i>Mergellus albellus</i>	Harle plette	VU	A2a
Oiseaux hivernants	<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons	VU	A2a
Oiseaux hivernants	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	NT	pr. A2a
Oiseaux hivernants	<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	NT	pr. A2a
Oiseaux hivernants	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	NT	pr. A4a
Oiseaux hivernants	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	NT	pr. A2a
Oiseaux hivernants	<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	NT	VU (D1) (-1)
Oiseaux hivernants	<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse	NT	VU (D1) (-1)
Oiseaux hivernants	<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Mareca penelope</i>	Canard siffleur	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	LC	
Oiseaux hivernants	<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	LC	

Domaine taxinomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Liste rouge Grand Est Catégorie UICN	Critères UICN
Oiseaux hivernants	<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Aquila clanga</i>	Aigle criard	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Aquila fasciata</i>	Aigle de Bonelli	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Gallinago media</i>	Bécassine double	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Motacilla yarrellii</i>	Bergeronnette de Yarrell	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonnette	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Emberiza rustica</i>	Bruant rustique	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran huppé	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Cormoran pygmée	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Corvus cornix</i>	Cornille mantelée	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Oxyura leucocephala</i>	Érismature à tête blanche	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Pastor roseus</i>	Étourneau roselin	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Falco cherrug</i>	Faucon sacre	NAo	

Domaine taxinomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Liste rouge Grand Est Catégorie UICN	Critères UICN
Oiseaux hivernants:	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Larus glaucoides</i>	Goéland à ailes blanches	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Geokichla sibirica</i>	Grive de Sibérie	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Zoothera aurea</i>	Grive dorée	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Haematopus ostralegus</i>	Huitrier pie	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Zapornia parva</i>	Marouette poussin	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Xema sabini</i>	Mouette de Sabine	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Larus minutus</i>	Mouette pygmée	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Oedicnème criard	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Anser erythropus</i>	Oie naine	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Panurus biarmicus</i>	Panure à moustaches	NAo	
Oiseaux hivernants:	<i>Pelecanus crispus</i>	Pélican frisé	NAo	

Domaine taxinomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Liste rouge Grand Est Catégorie UICN	Critères UICN
Oiseaux hivernants	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Anthus petrosus</i>	Pipit maritime	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Gavia adamsii</i>	Plongeon à bec blanc	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Eudromias morinellus</i>	Pluvier gulgnard	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Pouillot à grands sourcils	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Phylloscopus humei</i>	Pouillot de Hume	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Remiz pendulinus</i>	Rémiz penduline	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Arenaria interpres</i>	Tournepiere à collier	NAo	
Oiseaux hivernants	<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Pyrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	NAd	
Oiseaux hivernants	<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	NAd	

Domaine taxinomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Grand Est Catégorie UICN	Critères UICN
Oiseaux hivernants:	<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du nord	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	NAd	
Oiseaux hivernants:	<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Accipiter nisus</i>	Épervier d'Europe	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	NAns	
Oiseaux hivernants:	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	NAns	

Domaine taxinomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Liste rouge Grand Est Catégorie UICN	Critères UICN
Oiseaux hivernants	<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Clangula hyemalis</i>	Harelde boréale	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Melanitta fusca</i>	Macreuse brune	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Turdus merula</i>	Merle noir	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Parus ater</i>	Mésange noire	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Gavia arctica</i>	Plongeon arctique	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Gavia immer</i>	Plongeon imbrin	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Saxicola torquatus</i>	Tarier pâle	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	NAns	
Oiseaux hivernants	<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	NAI	



Préserver ou renaturer les milieux aquatiques et zones humides

- En encourageant les créations et restauration des zones humides par les collectivités, les Agences de l'eau et l'Etat.
- En encourageant la conservation ou la restauration des zones inondables des lits majeurs des cours d'eau.
- En limitant les dérangements hivernaux liés aux activités de loisir (chasse, pêche, planche à voile, etc.) sur les plans d'eau accueillant un grand nombre d'oiseaux aquatiques.

Encourager une agriculture plus respectueuse de la biodiversité

- En développant l'agriculture biologique.
- En limitant les pesticides et engrais chimiques qui réduisent les ressources alimentaires des oiseaux (rougeurs, graminées, etc.).
- En multipliant les jachères, ressources alimentaires hivernales et refuges pour de nombreux oiseaux.
- En conservant ou recréant des haies multistratifiées riches en arbustes à baies et composées d'essences autochtones.
- En conservant et recréant des prairies permanentes.
- En retardant les labours pour conserver les ressources alimentaires pour les oies et les cygnes.



Favoriser la biodiversité dans les forêts

- En plantant des essences autochtones.
- En diversifiant les essences pour éviter les parcelles monospécifiques.
- En favorisant un étalement des âges pour éviter les formations équiennes (plus de coupes rases).
- En multipliant les îlots de sénescences et les réserves naturelles forestières.





VU
Vulnérable



LE HARLE PIETTE
Mergellus albellus

Le Harle piette se reproduit dans la taïga et la toundra boisée d'Eurasie, de la Norvège au Kamtchatka, entre le 55° parallèle et le cercle polaire. Les populations à l'ouest de l'Oural hivernent principalement en mer du Nord (mer des Wadden) et en mer Baltique. Une partie de ces oiseaux apparaît en France au gré des vagues de froid, mais les effectifs restent faibles, atteignant 100 à 150 individus. La région Grand Est accueille plus de 80% de la population nationale. Les principaux sites d'hivernage sont les gravières du Perthois, le cours du Rhin, les étangs de Moselle, de la Woèvre et de Champagne humide. Cet oiseau n'apparaît en nombre que lors des vagues de froid et des périodes de gel qui le forcent à quitter ses lieux d'hivernage habituels. Une diminution régulière du nombre d'individus est observée depuis plusieurs années. Les hivers plus doux peuvent expliquer ce phénomène. Le Harle piette est classé Vulnérable en France et le déclin observé dans le Grand Est justifie le même classement à l'échelle régionale.





L'OIE DES MOISSONS
Anser fabalis

L'Oie des moissons se reproduit dans la taïga et la toundra d'Eurasie. Les oiseaux hivernant dans le Grand Est proviennent de la toundra du nord-ouest de la Russie alors que les oiseaux fenno-scandinaves hivernent principalement dans les îles britanniques. La quasi-totalité des individus passant l'hiver en France se trouvent dans le Grand Est et principalement dans la plaine rhénane. Les troupes comptant parfois plus d'un millier d'oiseaux ont la particularité de se nourrir en journée dans les cultures céréalières ou les éteules de maïs et de se réunir en dortoirs sur les plans d'eau calmes pour y passer la nuit en toute sécurité. La population du Grand Est compte 1000 à 2000 individus selon les hivers alors qu'elle était deux fois plus importante dans les années 1990. Ce déclin justifie la présence de l'espèce sur la liste rouge. Les mouvements migratoires sont liés aux vagues de froids et le réchauffement climatique peut expliquer cette diminution. Elle a d'ores et déjà disparu ou s'est raréfiée dans les pays les plus méridionaux (Espagne, Italie, Hongrie).



NTQuasi
menacée

LE BUSARD SAINT-MARTIN
Circus cyaneus

Le Busard Saint-Martin se reproduit dans une grande partie de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. Il niche aussi dans le Grand Est, mais en hiver la région accueille également un contingent venu d'Europe du Nord et Centrale. Les oiseaux sont alors visibles chassant à faible hauteur en milieu ouvert. Le soir, ils se regroupent en dortoirs de quelques individus à une vingtaine d'oiseaux, rarement plus, dans les friches et formations herbacées hautes. Un déclin marqué est observé dans le Grand Est au cours des 30 derniers hivers. Les raisons de cette régression pourraient être la diminution des prairies et des friches, ses terrains de chasse privilégiés, ainsi que la réduction des ressources alimentaires constituées principalement de campagnols. Le réchauffement climatique peut aussi expliquer en partie la diminution du nombre d'hivernants. Le Busard Saint-Martin est un migrateur partiel qui effectue ses passages d'automne plus tardivement qu'auparavant et les déplacements sont certainement moins étendus.



LA NETTE ROUSSE
Netta rufina

La Nette rousse est surtout une espèce d'Asie centrale et d'Europe méridionale. Ce canard est un hivernant en augmentation, notamment sur les lacs suisses, principaux sites d'hivernages en Europe. En France, la Camargue et le Lac du Bourget accueillent les plus gros contingents qui totalisent environ 4000 oiseaux sur les 7000 à 8000 hivernants du pays. Un effectif croissant est également observé dans le Grand Est depuis 30 ans, pour atteindre moins d'un millier d'individus. Les principaux sites d'hivernage dans la région sont les gravières du Perthois et les lacs de la Forêt d'Orient qui abritent parfois plus de 600 de ces oiseaux. Des individus sont aussi réguliers sur le Rhin et divers plans d'eau à travers la région.



NT
Quasi
menacée



LC
Préoccupation
mineure



LA GRANDE AIGRETTE
Ardea alba

Cosmopolite, la Grande Aigrette est présente sur tous les continents. Elle était autrefois extrêmement rare en France. Le pays n'accueillait que quelques individus en période hivernale. Suite à l'arrêt des destructions pour la plumasserie et à la protection des colonies de reproduction en Europe Centrale, le nombre d'oiseaux venant passer l'hiver en France et dans le Grand Est n'a cessé de croître entre les années 1990 et le milieu des années 2010, pour atteindre un plateau à plusieurs milliers d'individus. Parallèlement, le nombre d'oiseaux estivants a aussi augmenté. La reproduction a même été constatée en Champagne-Ardenne. La Grande Aigrette est largement répartie dans le Grand Est, où elle affectionne particulièrement les étangs et les lacs de Lorraine et de Champagne et la plaine rhénane. Elle fréquente également les herbages et les cultures.



NA

Non applicable



LE JASEUR BORÉAL
Bombycilla garrulus

Le Jaseur boréal se reproduit dans les forêts septentrionales de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. Migrateurs partiels, les oiseaux en provenance de Fennoscandie s'observent de façon très variable en France. Quasi-absents la plupart des hivers, des invasions massives s'observent parfois, notamment dans le Grand Est. Ces apparitions sont les effets combinés d'une bonne reproduction et d'une mauvaise fructification des sorbiers des oiseleurs, sa principale nourriture sur ses sites d'hivernage habituels. Des oiseaux peuvent alors apparaître par milliers, comme ce fût le cas lors de la dernière grande invasion de l'hiver 2004-2005, dont l'effectif a culminé en février-mars 2005. Des bandes de centaines d'oiseaux étaient alors visibles, se nourrissant de boules de gui, de pommes restées sur les arbres ou de cynorhodons. Cette invasion historique a été suivie de deux autres, moins importantes, en 2008-2009 et en 2012-2013.





EN SAVOIR PLUS SUR LES LISTES ROUGES

La démarche



Les résultats détaillés



REMERCIEMENTS

Particulièrement chaleureux à l'ensemble des naturalistes bénévoles qui partagent leurs observations et rendent la réalisation de tels documents possibles.

À l'ensemble du comité d'experts, ainsi que tous les partenaires scientifiques, techniques et financiers qui se sont mobilisés pour ce projet.

TRAITEMENTS DES DONNÉES ET ANALYSES PRÉPARATOIRES

Wendy Hahn

APPUI ET CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES

Dylan Cadiou (UICN France),
Léna Baraud (UICN France)

MISE EN PAGE

Carole Sirlin

RÉDACTION

Eric Buchel, Aymeric Mionnet, Yves Muller

RELECTURE

Eric Buchel, Anaïs Gsell-Epailly, Wendy Hahn, Aymeric Mionnet, Yves Muller

RÉFÉRENCES CITÉES

1 - Europe :

BirdLife International (2021). European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

2 - France :

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.

CITATION RECOMMANDÉE

ODONAT Grand Est (coord.), 2024.- Liste rouge des Oiseaux hivernants. Collection « Les Listes rouges des espèces menacées du Grand Est - Volet faune », ODONAT Grand Est, Strasbourg, 20 p.



Cette liste rouge a été
validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine naturel (23 novembre 2023)
et labellisée par l'UICN (11 juin 2024)



Avec le soutien de



**PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction régionale
de l'environnement,
de l'aménagement
et du logement