


LISTE ROUGE DES ORTHOPTÈRES & MANTOPTÈRES DU GRAND EST

LISTE DÉTAILLÉE DES ESPÈCES

2024



Les Listes rouges des espèces menacées en Grand Est

Volet Faune



LISTE DES ESPÈCES [1/4] (ORDRE TAXINOMIQUE) SAUTERELLES

NOMENCLATURE TAXINOMIQUE					LISTE ROUGE GRAND EST (EVALUATION UICN)				STATUTS DE PRESENCE DANS LES PRINCIPALES REGIONS NATURELLES									LISTES ROUGES UICN SUPRAREGIONALES				
DOMAINE TAXINOMIQUE	FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE	AUTEUR	NOM_VERNACULAIRE	Catégorie UICN (détaillée)	Critères UICN	Remarque évaluation Grand Est	Tendance récente Grand Est	Tendance récente Grand Est UICN	Plateau de Brie	Champagne crayeuse	Arc de la Champagne humide	Massif des Ardennes	Plateau lorrain occidental, Woivre et reliefs pré-ardennais	Plateau lorrain oriental et Warndt	Massif des Vosges	Vallée du Rhin	Massif du Jura	Liste rouge France	Liste rouge Europe	Liste rouge Monde	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera falcata</i>	(Poda, 1761)	Phanérotptère commun	LC		Espèce à surveiller : répandue, mais localement relativement exigeante en terme d'habitats, possiblement en déclin (estimée en régression dans le Bade-Wurtemberg).	↘?	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera nana</i>	Fieber, 1853	Phanérotptère méridional	LC		Espèce en progression dans tout le Grand Est.	↗	↗	●	●	●	?	●	●	●	●	●			LC	LC
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Isohya pyrenaica</i>	(Audinet Serville, 1838)	Barbitiste des Pyrénées	LC	NT pr. B2a (-1)	Espèce de détectabilité faible avec connaissances restreintes sur sa répartition exacte (actuellement localisée), mais dont les habitats semblent peu menacés.	↗?	↗	⊕	⊕	?	-	⊕	⊕	-	-	-			LC	LC
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Barbitistes serricauda</i>	(Fabricius, 1794)	Barbitiste des bois	LC		Espèce forestière et de lisière, de détectabilité faible, avec une répartition discontinue en Grand Est et centrée sur la zone d'influence continentale. Evolution de l'aire à surveiller, avec les modifications des peuplements forestiers.	?	?	?	-	⊕	●	●	●	●	●	●			LC	LC
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Leptophyes punctatissima</i>	(Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée	LC		Espèce de détectabilité moyenne, mais répandue et commune.	?	?	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	LC
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Polysarcus denticauda</i>	(Charpentier, 1825)	Barbitiste ventru	CR	B2ab(ii)	Espèce avec aire de présence très restreinte (circonsrite à un réseau de chaumes dans les Hautes Vosges), et très sensible à la dégradation de ses habitats.	↘	↘	-	-	-	-	-	-	●	-	-			LC	LC
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Mecanema thalassinum</i>	(De Geer, 1773)	Méconème tambourinaire	LC		Espèce répandue mais à surveiller, possiblement en déclin (estimée en régression dans le Bade-Wurtemberg).	↘?	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	LC
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Mecanema meridionale</i>	Costa, 1860	Méconème fragile	LC		Espèce en forte dynamique positive.	↗	↗	●	●	●	?	●	●	●	●	●			LC	LC
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Conocephalus fuscus</i>	(Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré	LC			↘?	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Conocephalus dorsalis</i>	(Latreille, 1804)	Conocéphale des Roseaux	VU	B2ab(iii)	Espèce exigeante (associée aux milieux hygrophiles en bon état de conservation), à répartition fragmentée et capacités de dispersion limitées.	↘?	↘	●	●	●	⊕	●	●	⊕	⊕	-			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Ruspola nitidula</i>	(Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux	LC		Espèce en forte progression dans tout le Grand Est.	↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Tettigonia viridissima</i>	L., 1758	Grande Sauterelle verte	LC		Espèce répandue partout à basse altitude, et qui étend progressivement son aire de présence en altitude.	↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Tettigonia cantans</i>	(Fuessly, 1775)	Sauterelle cymbalière	LC		Espèce principalement circonscrite aux milieux d'altitude, qui reste très localisée en plaine (expansions néanmoins constatées localement).	↗	↗	-	-	-	●	⊕	⊕	●	⊕	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Decticus verrucivorus</i>	(L., 1758)	Dectique verrucivore	VU	B2ab(iii, iv)	Espèce à répartition très fragmentée, un peu plus fréquente sur les reliefs, mais avec une régression forte des stations de plaine.	↘	↘	?	●	⊕	-	●	●	●	⊕	⊕			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Platycleis albopunctata</i>	(Goeze, 1778)	Decticelle chagrinée	LC			?	?	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Tessellana tessellata</i>	(Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée	LC		Espèce thermophile, avec aire de présence circonscrite à quelques régions naturelles les plus chaudes, mais probablement en expansion localement.	↗	↗	⊕	●	⊕	-	●	⊕	⊕	●	?			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Metrioptera brachyptera</i>	(L., 1761)	Decticelle des bruyères	VU	B2ab(iii, iv)	Espèce sténobèce avec aire de présence circonscrite et fragmentée : plus régulière sur les reliefs, mais écotype associé aux pelouses sèches et landes sablonneuses nettement plus rare à basse altitude.	→?	→	?	⊕	⊕	●	?	●	⊕	⊕			LC		
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Metrioptera saussuriana</i>	(Frey-Gessner, 1872)	Decticelle des alpages	NT	pr. B(1+2)a	Espèce avec aire de présence restreinte et circonscrite aux Hautes Vosges, mais dans des habitats assez divers et sans déclin constaté.	→?	→	-	-	-	-	-	-	●	-	-				
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Bicolorana bicolor</i>	(Philippi, 1830)	Decticelle bicolor	LC			↘?	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Roeseliana roeselii</i>	(Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée	LC		Espèce plutôt en expansion.	↗?	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	(De Geer, 1773)	Decticelle cendrée	LC			→?	→	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Gampsocleis glabra</i>	(Herbst, 1786)	Dectique des brandes	RE		Espèce collectée en 1888 d'un savant (disparu) à Origny-le-Sec dans l'Aube. Cité de façon erronée du plateau de Gerbarmont dans les Vosges. Subsiste encore actuellement en Côte-d'Or.	NE	NE	-	†	-	-	-	-	-	-	-			NT	LC
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Rhacocleis annulata</i>	Fieber, 1853	Decticelle annelée	NAI		Espèce très localisée, mais en phase d'implantation dans des zones urbaines (introduction passive).	↗?	↗	-	-	-	-	-	-	-	ï	-			LC	
Orthoptères	Tettigoniidae	<i>Ephippigera diurnus</i>	Dufour, 1841	Éphippigère des vignes	VU	B2ab(iii, iv)	Espèce exigeante, associée à des habitats fragiles et menacés, dont l'aire de présence régionale se contracte.	↘→	→	●	●	⊕	-	●	⊕	●	⊕	-			LC	LC
Orthoptères	Raphidophoridae	<i>Diastrammena asynomora</i>	(Adelung, 1902)	Sauterelle des serres	NAI		Espèce introduite acclimatée de longue date dans des serres (notamment jardin botanique de Strasbourg).	NE	NE	-	-	-	-	-	-	-	ï	-				

LISTE DES ESPÈCES [2/4] (ORDRE TAXINOMIQUE) GRILLONS & TÉTRIX

NOMENCLATURE TAXINOMIQUE					LISTE ROUGE GRAND EST (EVALUATION UICN)				STATUTS DE PRÉSENCE DANS LES PRINCIPALES RÉGIONS NATURELLES										LISTES ROUGES UICN SUPRAREGIONALES		
DOMAINE TAXINOMIQUE	FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE	AUTEUR	NOM_VERNACULAIRE	Catégorie UICN (détaillée)	Critères UICN	Remarque évaluation Grand Est	Tendance récente Grand Est	Tendance récente Grand Est UICN	Plateau de Brie	Champagne crayeuse	Arc de la Champagne humide	Massif des Ardennes	Plateau lorrain occidental, Woëvre et reliefs pré-ardennais	Plateau lorrain oriental et Warndt	Massif des Vosges	Vallée du Rhin	Massif du Jura	Liste rouge France	Liste rouge Europe	Liste rouge Monde
Orthoptères	Gryllidae	<i>Gryllus campestris</i>	L., 1758	Grillon champêtre	LC		Espèce possiblement en augmentation, avec un accroissement des observations de seconde génération annuelle.	↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC
Orthoptères	Gryllidae	<i>Gryllus bimaculatus</i>	De Geer, 1773	Grillon provençal	NAo		Espèce notée sporadiquement dans quelques villes (introduction passive), implantation à confirmer.	NE	NE	-	-	-	-	-	o	-	-	-			LC
Orthoptères	Gryllidae	<i>Acheta domesticus</i>	(L., 1758)	Grillon domestique	NAi		Espèce anthropophile introduite de longue date en Europe : anciennement assez commune puis probablement disparue avec l'assainissement des bâtiments, elle se maintient localement dans des zones d'habitats par des populations rares et fluctuantes issues d'élevage.	↘→	→	?	●	?	?	●	●	●	●	?			LC
Orthoptères	Gryllidae	<i>Modicogryllus frontalis</i>	(Fieber, 1844)	Grillon oriental, Grillon à front jaune	DD		Espèce en limite d'aire occidentale, connue uniquement de deux localités en vallée du Rhin (autochtone possible mais difficile à prouver), où elle s'est établie dans des habitats de faible naturalité.	↗?	↗	-	-	-	-	-	-	-	Φ	-			LC
Orthoptères	Gryllidae	<i>Eumodigryllus bordigalensis</i>	(Latreille, 1804)	Grillon bordelais	LC		Espèce circonscrite dans la partie sud du Grand Est (récemment découvert en Lorraine), mais en nette expansion et dans des habitats divers.	↗	↗	●	●	●	-	●	●	-	●	-			LC
Orthoptères	Oecanthidae	<i>Oecanthus pellucens</i>	(Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie	LC		Espèce en expansion.	↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC
Orthoptères	Phalangopsidae	<i>Gryllomorpha dalmatina</i>	(Ocskay, 1832)	Grillon des bastides	NAi		Espèce troglodyte, avec quelques populations connues depuis des décennies dans des bâtiments en Alsace (introduction passive).	NE	NE	-	-	-	-	-	-	-	ï	-			LC
Orthoptères	Trigonidiidae	<i>Nemobius sylvestris</i>	(Bosc, 1792)	Grillon des bois	LC			↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC
Orthoptères	Trigonidiidae	<i>Pteronemobius heydenii</i>	(Fischer, 1853)	Grillon des marais	LC		Espèce encore très rare en Grand Est, mais en progression récente vers le nord, souvent dans des habitats anthropisés. Son bastion de présence actuel reste néanmoins restreint à une population ancienne typique des milieux alluviaux rhénans à forte naturalité en Alsace, à préserver.	↗	↗	?	Φ	Φ	-	Φ	?	Φ	●	-			LC
Orthoptères	Trigonidiidae	<i>Pteronemobius lineolatus</i>	(Brullé, 1835)	Grillon des torrents	NAi		Espèce connue d'une seule station, découverte récemment dans une zone d'activité en Meurthe-et-Moselle (introduction passive très probable).	NE	NE	-	-	-	-	-	ï	-	-	-			LC
Orthoptères	Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	(L., 1758)	Courtillière commune	LC		Espèce répandue, mais assez mal connue (passe souvent inaperçue), avec régression possible de ses habitats localement (principalement milieux hygrophiles).	↘→	→	●	●	●	?	●	●	●	●	?			LC
Orthoptères	Tetrigidae	<i>Tetrix subulata</i>	(L., 1758)	Tétrix riverain	LC			?	?	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC
Orthoptères	Tetrigidae	<i>Tetrix bolivari</i>	Saulcy, in Azam, 1904	Tétrix caucasien	DD		Espèce méridionale en limite d'aire, mal connue (cryptique, difficile à trouver), dont l'aire d'occupation régionale actuellement identifiée est excessivement limitée (quelques stations dans quatre départements).	?	?	Φ	-	-	-	Φ	Φ	-	-	-			LC
Orthoptères	Tetrigidae	<i>Tetrix ceperai</i>	Bolivar, 1887	Tétrix des vasières	LC		Espèce circonscrite aux zones les plus chaudes, où elle est globalement rare et associée à des milieux pionniers.	?	?	●	●	●	-	●	●	-	●	-			LC
Orthoptères	Tetrigidae	<i>Tetrix tenuicornis</i>	(Ebner, 1910)	Tétrix longicorne, Tétrix des carrières	LC			↘?	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC
Orthoptères	Tetrigidae	<i>Tetrix bipunctata</i>	(L., 1758)	Tétrix des sables, Tétrix bipoctué	CR*	B2ab(III, IV)	Espèce non revue cette dernière décennie, dans les très rares stations signalées en Grand Est.	↘	↘	-	Φ	-	Φ	-	-	Φ	-	Φ			LC
Orthoptères	Tetrigidae	<i>Tetrix kraussi</i>	Saulcy, 1889	Tétrix des larris	EN	B2ab(II, IV)	Espèce pionnière des pelouses très rases, très localisée, dont les habitats sont en déclin.	↘	↘	-	-	-	-	●	-	Φ	●	?			
Orthoptères	Tetrigidae	<i>Tetrix undulata</i>	(Sowerby, 1806)	Tétrix commun, Tétrix forestier	LC		Espèce répandue, surtout présente sur les reliefs, sensiblement moins fréquente en plaine.	?	?	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC

LISTE DES ESPÈCES [3/4] (ORDRE TAXINOMIQUE) CRIQUETS

NOMENCLATURE TAXINOMIQUE					LISTE ROUGE GRAND EST (EVALUATION UICN)				STATUTS DE PRESENCE DANS LES PRINCIPALES REGIONS NATURELLES									LISTES ROUGES UICN SUPRAREGIONALES			
DOMAINE TAXINOMIQUE	FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE	AUTEUR	NOM_VERNACULAIRE	Catégorie UICN (détaillée)	Critères UICN	Remarque évaluation Grand Est	Tendance récente Grand Est	Tendance récente Grand Est UICN	Plateau de Brie	Champagne crayeuse	Arc de la Champagne humide	Massif des Ardennes	Plateau lorrain occidental, Woëvre et reliefs pré-ardennais	Plateau lorrain oriental et Warndt	Massif des Vosges	Vallée du Rhin	Massif du Jura	Liste rouge France	Liste rouge Europe	Liste rouge Monde
Orthoptères	Acrididae	<i>Miramella alpina</i>	(Kollar, 1833)	Miramelle fontinale	EN	B(1+2)ab(i, iv)	Espèce orophile circonscrite aux Hautes Vosges, dont l'aire se réduit progressivement (disparaît dans toute la partie basse de son aire).	↘	↘	-	-	-	-	-	-	●	-	-		LC	LC
Orthoptères	Acrididae	<i>Calliptamus italicus</i>	(L., 1758)	Criquet italien, Caloptène italien	LC		Espèce en expansion.	↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Calliptamus barbarus</i>	(Costa, 1836)	Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie	EN	B2ab(ii)	Espèce rare, avec aire de présence restreinte circonscrite dans le sud du Grand Est (stable ?), associée le plus souvent à des petits milieux rupestres en bon état de conservation (localement peut coloniser des habitats secondaires proches).	→?	→	-	-	Φ	-	●	-	●	Φ	-		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Anacridium aegyptium</i>	(L., 1764)	Criquet égyptien	NAo		Espèce non établie en Grand Est (apparitions occasionnelles de migrants erratiques ou d'imagos transportés).	NE	NE	?	?	?	?	○	?	?	○	?		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Pezotettix giornae</i>	(Rossi, 1794)	Criquet pansu	NAi		Espèce connue d'une seule station, découverte récemment dans l'Aube (introduction passive probable).	NE	NE	-	-	ï	-	-	-	-	-	-		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Aiolopus thalassinus</i>	(Fabricius, 1781)	Aiolope émeraude	LC		Espèce surtout présente en vallée du Rhin, plus rare vers l'ouest, mais en expansion.	↗	↗	?	Φ	?	-	●	●	●	●	?		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Mecostethus parupleurus</i>	(Hagenbach, 1822)	Criquet des Roseaux	LC		Espèce en expansion.	↗	↗	?	●	●	-	●	●	●	●	●		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Stethophyma grossum</i>	(L., 1758)	Criquet ensablanté	LC		Espèce répandue, mais surtout abondante en milieux hygrophiles.	→?	→	●	●	●	●	●	●	●	●	●		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Oedipoda caerulescens</i>	(L., 1758)	Oedipode turquoise	LC		Espèce en expansion.	↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Oedipoda germanica</i>	(Latreille, 1804)	Oedipode rouge	CR	C2a(i)	Espèce en forte régression partout dans le nord de l'Europe, avec quelques très rares stations relictuelles en Grand Est, toutes avec des effectifs réduits.	↘	↘	-	-	-	-	↓	↓	↓	○	-		LC	LC
Orthoptères	Acrididae	<i>Lacusta cinerascens</i>	(Fabricius, 1781)	Criquet cendré	VU	D2	Espèce dont une seule population pérenne est connue (Bas-Rhin) sur une lande remarquable semblable à ses milieux originaux (taxinomie exacte à confirmer). Imagos erratiques ou échappés (espèce commercialisée) possiblement observables partout ailleurs dans le Grand Est.	↘?	↘	?	?	?	?	○	?	Φ	?		LC		
Orthoptères	Acrididae	<i>Psophus stridulus</i>	(L., 1758)	Oedipode stridulante	CR	C2a(i)	Espèces avec stations très rares, déconnectées, toutes avec des effectifs très réduits.	↘	↘	-	-	-	-	Φ	-	↓	-	↓		LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Sphingonotus caerulans s.l.</i>	(L., 1767)	Oedipode nordique, Oedipode algue-marine	LC		Espèce à la taxinomie en évolution récente, à évaluer plus précisément en Grand Est : l'Oedipode nordique <i>Sphingonotus caerulans</i> y est confirmé génétiquement, une deuxième espèce est potentielle. Espèce(s) en progression, associée(s) le plus souvent à des milieux anthropiques.	↗	↗	?	●	●	-	●	●	●	●	?		LC	

LISTE DES ESPÈCES [4/4] (ORDRE TAXINOMIQUE) CRIQUETS & MANTES


NOMENCLATURE TAXINOMIQUE					LISTE ROUGE GRAND EST (EVALUATION UICN)				STATUTS DE PRESENCE DANS LES PRINCIPALES REGIONS NATURELLES										LISTES ROUGES UICN SUPRAREGIONALES			
DOMAINE TAXINOMIQUE	FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE	AUTEUR	NOM_VERNACULAIRE	Catégorie UICN (détaillée)	Critères UICN	Remarque évaluation Grand Est	Tendance récente Grand Est	Tendance récente Grand Est UICN	Plateau de Brie	Champagne crayeuse	Arc de la Champagne humide	Massif des Ardennes	Plateau lorrain occidental, Woëvre et reliefs pré-ardennais	Plateau lorrain oriental et Warndt	Massif des Vosges	Vallée du Rhin	Massif du Jura	Liste rouge France	Liste rouge Europe	Liste rouge Monde	
Orthoptères	Acrididae	<i>Chrysochraon dispar</i>	(Germar, 1834)	Criquet des clairières	LC			?	?	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Euthystira brachyptera</i>	(Ocksay, 1826)	Criquet des Génévriers	LC		Espèce avec répartition hétérogène : surtout implantée dans le massif vosgien (écotype orophile), mais stations plus dispersées ailleurs (écotype de milieux secs).	?	?	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Euchorthippus declivus</i>	(Brisout de Barneville, 1849)	Criquet des Bromes	LC		Espèce dont l'aire de présence est circonscrite à la frange occidentale du Grand Est, mais en expansion vers le nord-est.	↗	↗	●	●	●	○	○	○	○	○	○			LC	LC
Orthoptères	Acrididae	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	(Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures	LC			↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Pseudochorthippus montanus</i>	(Charpentier, 1825)	Criquet palustre	VU	B2ab(iii)	Espèce associée aux prairies humides en bon état. Surtout présente sur les reliefs, mais stations de plaine très localisées et en régression.	↘	↘	○	○	○	●	○	○	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Omocestus rufipes</i>	(Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébéne	LC		Espèce principalement associée aux ourlets thermophiles.	↘?	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Omocestus viridulus</i>	(L., 1758)	Criquet verdelet	LC		Espèce localement abondante dans son aire principale, circonscrite sur les reliefs. En dehors, stations très rares.	→?	→	○	○	○	●	○	○	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	(Charpentier, 1825)	Criquet rouge-queue	VU	B2ab(iii)	Espèce exigeante associé à des milieux thermophiles de qualité. Stations de plus en plus rares en plaine, plus fréquentes dans le massif vosgien.	↘	↘	○	○	○	○	○	○	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	(Thunberg, 1815)	Criquet tacheté, Gompocère tacheté	NT	pr. B2	Espèce surtout présente sur les reliefs vosgiens, plus rare et exigeante en plaine.	→?	→	○	○	○	○	○	○	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	(Rambur, 1838)	Sténobothre nain	EN	B2ab(iii)	Espèce peu mobile, avec stations très localisées.	↘?	↘	○	○	○	○	○	○	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Stenobothrus lineatus</i>	(Panzer, 1796)	Sténobothre de la Palène	LC			→?	→	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>	(Herrich-Schäffer, 1840)	Sténobothre bourdonneur	CR	B2ab(iii,iv)	Espèce avec stations actuelles excessivement localisées : une seule en Lorraine, connaissances récentes à affiner en Champagne (mais habitats restreints et en mauvais état de conservation). En Europe, en forte régression ou disparu dans les régions de plaine du nord de son aire.	↘	↘	○	○	○	○	○	○	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Chorthippus dorsatus</i>	(Zetterstedt, 1821)	Criquet verte-échine	LC			↗?	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	(De Geer, 1773)	Criquet marginé	LC		Espèce en expansion.	↗	↗	●	●	●	●	●	●	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Gomphocerippus vagens</i>	(Eversmann, 1848)	Criquet des Pins	NT	pr. B2b(iii)	Espèce avec aire d'occupation restreinte : stations surtout concentrées dans le massif vosgien, nettement plus rares en plaine (habitats fragmentés et rares).	→?	→	○	○	○	○	○	○	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Gomphocerippus brunneus</i>	(Thunberg, 1815)	Criquet duettiste	LC			→?	→	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	LC
Orthoptères	Acrididae	<i>Gomphocerippus mollis</i>	(Charpentier, 1825)	Criquet des larris	LC		Espèce pionnière, avec une assez large répartition en Grand Est, mais dont les stations sont relativement dispersées.	?	?	●	●	●	○	○	○	○	○	○			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Gomphocerippus biguttulus</i>	(L., 1758)	Criquet mélodieux	LC			→?	→	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Orthoptères	Acrididae	<i>Gomphocerippus rufus</i>	(L., 1758)	Gompocère roux	LC			→?	→	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	
Mantoptères	Mantidae	<i>Mantis religiosa</i>	L., 1758	Mante religieuse	LC			↗	↗	●	●	●	●	●	●	●	●	●			LC	

SYNTHÈSE

Catégories UICN		Nombre d'espèces	Proportion
RE	Eteint régionalement (RE)	1	1%
CR	En danger critique d'extinction (CR) <i>dont En danger critique d'extinction, présumé disparu (CR*)</i>	5 1	7% 1%
EN	En danger (EN)	4	6%
VU	Vulnérable (VU)	7	10%
NT	Quasi menacé (NT)	3	4%
LC	Préoccupation mineure (LC)	46	68%
DD	Données insuffisantes (DD)	2	3%

Sous-total Liste rouge


16 24%



Sous-total des taxons évalués		68	100%
NAi	Non applicable (NAi) - Taxon introduit dans la période récente (après 1500) dans la région étudiée	6	
NAr	Non applicable (NAr) - Taxon d'apparition récente (moins de 10 ans) dans la région étudiée	0	
NAo	Non applicable (NAo) - Taxon occasionnel, non implanté dans la région étudiée	2	
NAnc	Non applicable (NAnc) - Statut d'indigénat non confirmé dans la région étudiée	0	
NA	Sous-total des taxons Non applicable (NA)	8	
Total des taxons étudiés		76	

89%

11%





PHOTOGRAPHIES

Couverture : Éphippigère des vignes *Ephippiger diurnus* [VU] (R. d'Agostino) ;
 Mante religieuse *Mantis religiosa* [LC] (A. Chapman) ; Grillon oriental *Modicogryllus frontalis* [DD] (R. d'Agostino) ;
 Criquet noir-ébène *Omocestus rufipes* [LC] (T. Lux)
 4^e de couverture : Oedipode nordique *Sphingonotus caerulans s.l.* [LC] (R. d'Agostino)

POUR ALLER PLUS LOIN

La démarche



Légendes



Synthèse Orthoptères



Cette Liste rouge a été validée
 par le Conseil Scientifique Régional
 du Patrimoine Naturel (octobre 2023),
 et labellisée par l'UICN (mars 2024)



Comité
Français

Liste rouge régionale réalisée selon la
 méthodologie et la démarche de l'UICN

Avec le soutien de

