

# LISTE ROUGE DES REPTILES DU GRAND EST

LISTE DÉTAILLÉE DES ESPÈCES

2023



Les Listes rouges des espèces menacées en Grand Est  
Volet Faune




## LISTE DES ESPÈCES [1/1] (ORDRE TAXINOMIQUE)

NOMENCLATURE TAXINOMIQUE			LISTE ROUGE GRAND EST (EVALUATION UICN)			STATUTS DE PRESENCE DANS LES PRINCIPALES REGIONS NATURELLES									LISTES ROUGES UICN SUPRAREGIONALES		
NOM SCIENTIFIQUE	AUTEUR	NOM_VERNACULAIRE	Catégorie UICN (détaillée)	Critères UICN	Remarque évaluation Grand Est	Plateau de Brie	Champagne crayeuse	Arc de la Champagne humide	Massif des Ardennes	Plateau lorrain occidental, Woëvre et reliefs pré-ardennais	Plateau lorrain oriental et Warndt	Massif des Vosges	Vallée du Rhin	Massif du Jura	Liste rouge France	Liste rouge Europe	Liste rouge Monde
<i>Emys orbicularis</i>	(Linnaeus, 1758)	Cistude d'Europe	<b>NAnc</b>		Indigénat non confirmé en Grand Est.	-	-	-	-	○	○	○	○	-	LC	NT	NT
<i>Trachemys scripta</i>	(Thunberg in Schoepff, 1792)	Trachémide écrite	<b>NAi</b>		Espèce introduite, reproduction localement probable.	●	●	●	●	●	●	●	●	?	NA	NE	LC
<i>Lacerta agilis</i>	Linnaeus, 1758	Lézard des souches	<b>NT</b>	pr. A2b	Régression des habitats naturels de l'espèce, en particulier dans la partie occidentale du Grand Est.	●	●	●	-	●	●	●	●	●	NT	LC	LC
<i>Lacerta bilineata</i>	Daudin, 1802	Lézard à deux raies	<b>VU</b>	B2ab(iii)	Espèce en limite d'aire, localisée en Grand Est (absente de Lorraine). Fragmentation de ses habitats en Alsace et en Champagne-Ardenne.	●	●	●	-	●	-	●	●	-	LC	LC	LC
<i>Podarcis muralis</i>	(Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	<b>LC</b>		A surveiller (menaces potentielles liées à l'introduction de sous-espèces allochtones).	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LC	LC	LC
<i>Zootoca vivipara</i>	(Lichtenstein, 1823)	Lézard vivipare	<b>LC</b>		Stations localisées en dehors des reliefs.	●	⊕	●	●	●	●	●	⊕	⊕	LC	LC	LC
<i>Anguis fragilis</i>	Linnaeus, 1758	Orvet fragile	<b>LC</b>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	LC	LC	LC
<i>Natrix helvetica</i>	(Lacepède, 1789)	Couleuvre helvétique	<b>LC</b>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	LC	NE	NE
<i>Coronella austriaca</i>	Laurenti, 1768	Coronelle lisse	<b>NT</b>	pr. B2b(iii)	Régression des habitats naturels de l'espèce localement.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LC	LC	LC
<i>Hierophis viridiflavus</i>	(Lacepède, 1789)	Couleuvre verte et jaune	<b>LC</b>		Espèce en limite d'aire, très localisée en Grand Est, mais relativement adaptative et ubiquiste et montrant une dynamique positive.	-	?	●	-	●	●	●	-	-	LC	LC	LC
<i>Zamenis longissimus</i>	(Laurenti, 1768)	Couleuvre d'Esculape	<b>DD</b>		Espèce relativement ubiquiste mais très discrète et mal connue, avec une répartition restreinte limitée à une petite bordure méridionale de Haute-Marne.	-	-	-	-	●	●	○	-	-	LC	LC	LC
<i>Vipera aspis</i>	(Linnaeus, 1758)	Vipère aspic	<b>VU</b>	C2a(i)	Régression continue de la qualité des habitats naturels de l'espèce, fragmentation et déconnexion probable des populations autochtones. Introduite en Alsace.	-	●	●	-	●	●	ï	ï	?	LC	LC	LC
<i>Vipera berus</i>	(Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	<b>CR</b>	C2a(i)	Populations autochtones faibles et très fragmentées, régression des habitats naturels de l'espèce. Introduite dans le massif vosgien.	●	●	●	●	●	-	ï	-	-	VU	LC	LC

# SYNTHÈSE

Catégories UICN		Nombre d'espèces	Proportion
<b>RE</b>	Éteinte régionalement (RE)	0	0%
<b>CR</b>	En danger critique d'extinction (CR) <i>dont En danger critique d'extinction, présumé disparu (CR*)</i>	1 0	9% 0%
<b>EN</b>	En danger (EN)	0	0%
<b>VU</b>	Vulnérable (VU)	2	18%
<b>NT</b>	Quasi menacée (NT)	2	18%
<b>LC</b>	Préoccupation mineure (LC)	5	45%
<b>DD</b>	Données insuffisantes (DD)	1	9%


Sous-total Liste rouge  
**3** 27%



Sous-total des taxons évalués		11	100%
<b>NAi</b>	Non applicable (NAi) - Taxon introduit dans la période récente (après 1500) dans la région étudiée	1	
<b>NAr</b>	Non applicable (NAr) - Taxon d'apparition récente (moins de 10 ans) dans la région étudiée	0	
<b>NAo</b>	Non applicable (NAo) - Taxon occasionnel, non implanté dans la région étudiée	0	
<b>NAnc</b>	Non applicable (NAnc) - Statut d'indigénat non confirmé dans la région étudiée	1	
<b>NA</b>	<b>Sous-total des taxons Non applicable (NA)</b>	<b>2</b>	
<b>Total des taxons étudiés</b>		<b>13</b>	

85%

15%





## POUR ALLER PLUS LOIN


La démarche



Légendes



Synthèse Reptiles



Cette Liste rouge a été validée  
par le Conseil Scientifique Régional  
du Patrimoine Naturel (avril 2022),  
et labellisée par l'UICN (septembre 2022)



Liste rouge régionale réalisée selon la  
méthodologie et la démarche de l'UICN

## PHOTOGRAPHIES

Couverture : Orvet fragile *Anguis fragilis* [LC] - M. Aubry ;  
Lézard des souches *Lacerta agilis* [NT] - S. Vitzthum ;  
Couleuvre verte et jaune *Hierophis viridiflavus* [LC] - M. Aubry ;  
Lézard à deux raies *Lacerta bilineata* [VU] - M. Aubry

4<sup>e</sup> de couverture : Coronelle lisse *Coronella austriaca* [NT] - A. Farese

Avec le soutien de



**PRÉFET  
DE LA RÉGION  
GRAND EST**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale  
de l'environnement,  
de l'aménagement  
et du logement**