

Liste rouge de Champagne-Ardenne

Amphibiens

validée le 14 avril 2007
avis n°2007-4 du CSRPN
auteur : J-F CART

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| catégorie rouge : | E : espèce en danger = | espèce menacée de disparition à très court terme |
| | V : espèce vulnérable = | espèce en régression plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou espèce à effectif réduit mais dont la population est stable ou fluctuante |
| | R : espèce rare = | espèce à effectif plus ou moins faible mais en progression ou espèce stable ou fluctuante et localisée |
| | X : espèce disparue | |
| catégorie orange : | AP : espèce à préciser = | espèce commune et/ou à effectif encore important dont on ressent des fluctuations négatives |
| | AS : espèce à surveiller = | espèce commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne |

| noms français | noms latins | liste rouge de Champagne-Ardenne | observations |
|----------------------|--|----------------------------------|---|
| Crapaud accoucheur | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti 1768) | V | Disparition des mares-abreuvoirs, comblement des carrières |
| Crapaud calamite | <i>Bufo calamita</i> (Laurenti 1768) | E | Comblement et pollutions (d'origine agricole) des carrières, introduction de poissons carnassiers |
| Crapaud commun | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus 1758) | AS | Pollution, mortalité sur les routes, |
| Crapaud vert | <i>Bufo viridis</i> (Laurenti 1768) | X | |
| Grenouille agile | <i>Rana dalmatina</i> (Fitzinger 1838) | V | |
| Grenouille de lesson | <i>Rana lessonae</i> (Camerano 1882) | AP | |
| Grenouille rousse | <i>Rana temporaria</i> (Linnaeus 1758) | AS | Comblement des mares, drainage, mortalité sur les routes |

| noms français | noms latins | liste rouge de Champagne-Ardenne | observations |
|------------------------|---|----------------------------------|---|
| Pelobate brun | <i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti 1768) | X | |
| Pelodyte ponctué | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin 1802) | E | Comblement des mares, pompages et drainages |
| Rainette verte | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus 1758) | E | Comblement des mares, mise en cultures des prairies, pollution, facteurs inconnus |
| Salamandre tachetée | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus 1758) | V | Travaux forestiers |
| Sonneur à ventre jaune | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus 1758) | V | Comblement des mares, curage des fossés, débardage forestier en période de reproduction |
| Triton alpestre | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti 1768) | AP | |
| Triton crêté | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti 1768) | V | Remembrement agricole, disparition des mares et des petites zones humides |
| Triton palmé | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky 1789) | AS | |
| Triton ponctué | <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus 1758) | V | Comblement des mares, pollution |