



Sérotine commune (GEPMA)



RÉPARTITION - Période 2009|2010

ZOOM SUR...

La Sérotine commune

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)


La Sérotine commune est une chauve-souris d'assez grande taille principalement présente en plaine. Elle possède des oreilles noires, grandes, triangulaires avec un sommet arrondi. Les tragus sont courts, larges et arrondis, courbés vers l'avant du museau. Le pelage est long, soyeux avec un dos brun sombre à la base et plus clair à l'extrémité tandis que le ventre est plus clair (brun-jaune ou gris brun). La face et les ailes sont sombres.

En Alsace elle est peu répandue, excepté dans le Nord. Elle subsiste dans les secteurs qui présentent encore des prairies et une agriculture diversifiée, rarement à plus de 800 m d'altitude. Plutôt sédentaire, ses déplacements entre les gîtes d'été et d'hiver avoisinent les 50 km. Elle peut cependant parcourir de plus grandes distances, notamment lors de la dispersion d'individus. Il s'agit d'une espèce anthropophile, qui chasse des insectes au-dessus des prairies, le long des bois et de structures végétales de préférence. Les femelles se rassemblent pour la mise bas en colonies de 10 à 60 individus. Pendant l'été les mâles peuvent aussi former des colonies, jusqu'à une vingtaine d'individus. La Sérotine commune hiberne sous la toiture de bâtis, dans les greniers frais, parfois dans les mêmes

bâtis que ceux utilisés en été. Rarement, des individus isolés hibernent dans des cavités, au niveau de fissures profondes.

En Alsace la Sérotine commune ne semble pas menacée de disparition bien qu'elle reste rare sur les deux tiers Sud du territoire.

Parmi les menaces qui pèsent sur cette espèce peuvent être cités la pose de grillage anti-pigeons qui leur interdit l'accès aux combles des églises, le traitement des charpentes et les opérations de rénovation de bâtiments.



Habitat de la Sérotine commune (L.THITIET)