




Céphale (A. FIZESAN, Habsheim)



ZOOM SUR...

## Le Céphale

*Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1760)


Ce magnifique papillon forestier est de petite taille (envergure 4 cm). Il se pose les ailes fermées, et se fait surtout admirer par la coloration orangée du dessous, où tranche une nette bande blanche sur l'aile postérieure, bordée de plusieurs ocelles à centre noir pupillé de blanc. Une ligne argentée délimite finement la bordure de l'aile. Celle-ci s'estompe avec l'usage.

Il vole de fin mai à fin juillet, mais est principalement à rechercher en juin. Les adultes se posent souvent à faible hauteur sur les arbustes et les plantes hautes. Les femelles pondent sur diverses graminées. La chenille hiverne, puis éclos le printemps suivant.

Ce papillon est assez largement répandu en France, à basse et moyenne altitude. Il se raréfie cependant vers le nord. Ainsi, en Alsace, sa répartition est assez morcellée et circonscrite à quelques régions naturelles les plus chaudes : collines calcaires sous-vosgiennes, versants chauds des Vosges, et forêts thermophiles de la plaine haut-rhinoise. **Il est ainsi présent dans divers massifs forestiers de m2A (la Hardt, les forêts rhénanes, le Nonnenbruch et même le Zühren Wald), où il peut être observé dans divers endroits ensoleillés**

(lisières, larges layons ou encore pelouses et landes arborées périphériques). Il est cependant rarement rencontré en nombre et toutes les observations sont intéressantes.

**Les menaces semblent faibles, mais une gestion très extensive des lisières et layons herbacés en forêt lui est favorable, tout comme au cortège des papillons forestiers.**



Layon favorable au Céphale (A. FIZESAN, Niffer)