


- Pokaljungfer (*Erythromma lindenii*) (255.html)

Die Vogel-Azurjungfer kann mit den übrigen Azurjungfern verwechselt werden. Zur Bestimmung sollten stets Männchen betrachtet werden. Das wichtigste Bestimmungsmerkmal ist hierbei die schwarze Zeichnung auf dem 2. Hinterleibssegment. Diese hat bei der Vogel-Azurjungfer die Form eines Dreizacks. Besonders große Verwechslungsgefahr besteht mit dem Männchen der Helm-Azurjungfer. Zur Unterscheidung muss auch die schwarze Zeichnung auf den Segmenten 3 bis 6 betrachtet werden. Diese endet bei der Vogel-Azurjungfer in deutlich langgezogenen Spitzen. Ein weiteres wichtiges Erkennungsmerkmal findet sich bei beiden Geschlechtern auf der Hinterseite der Augen. Die Postokularflecken besitzen nämlich einen gezackten Rand. Fotografiert man die Libelle von schräg oben und hinten, ist dieses Merkmal gut zu erkennen.

Häufigkeit der Meldungen im Jahresverlauf

Ausgewerteter Zeitraum: Gesamtjahre 2006 bis 2025
 Art: Vogel-Azurjungfer, *Coenagrion ornatum*



© ArtenFinder Service-Portal (<http://www.artenfinder.rlp.de/maps>)

Die Larvaldauer ist unbekannt (Burbach 2015). Die Überwinterung erfolgt im Larvalstadium. Die ersten schlüpfenden Tiere können in Rheinland-Pfalz ab Mitte Mai beobachtet werden. Die Hauptflugzeit liegt im Juni und Juli.

ArtenFinder-Meldekarte

